

Evidenzkurzprofil zu Neratinib beim HER2-positiven frühen Mammakarzinom	
Population	Patientinnen mit hormonrezeptor-positiven, HER2-überexprimierenden Karzinomen im Stadium II bis III die vor weniger als einem Jahr eine Trastuzumab basierte adjuvante Therapie abgeschlossen haben
Intervention	Neratinib
Evidenzgrundlage:	Studie ExteNET (NCT00878709): Neratinib vs. Placebo zur erweiterten adjuvanten Behandlung (Quelle: Nutzenbewertungsverfahren zu Neratinib (2020))
GRADE	
⊕⊕⊕⊖	Rezidivfreies Überleben: Vorteil gegenüber Kontrolle
⊕⊕⊕⊕	Rezidivrate: Vorteil gegenüber Kontrolle
⊕⊕⊖⊖	Patientenberichtete Symptomatik: kein Unterschied (Gesundheitszustand)
⊕⊕⊖⊖	QoL: kein Unterschied (FACT-B Gesamtscore)
⊕⊕⊕⊕-⊕⊕⊕⊖	Gesamt-SUE, Gesamt-UE CTCAE Grad ≥ 3 , Therapieabbruch aufgrund von UE: Nachteile (UE CTCAE Grad ≥ 3 , Therapieabbruch) bzw. kein Unterschied (SUE)
⊕⊕⊖⊖	Spezifische UE: Nachteile
Quelle: Das Kurzprofil fasst die Ergebnisse der umfassenderen Evidenzaufarbeitungen zu medikamentösen Therapien beim frühen Mammakarzinom zusammen.	