

Evidenzkurzprofil zu Trastuzumab Deruxtecan beim HER2-positiven fortgeschrittenen oder metastasierten Mammakarzinom nach Vorbehandlung mit ≥ 2 HER2-gerichteten Therapien

Population	Patientinnen mit HER2-positiven fortgeschrittenen oder metastasierten Mammakarzinom nach Vorbehandlung mit mindestens zwei HER2-gerichteten Therapien
Intervention	Trastuzumab Deruxtecan
Evidenzgrundlage	Studie DESTINY-Breast02 (NCT03523585): Trastuzumab Deruxtecan vs. Lapatinib+ Capecitabin oder Trastuzumab + Capecitabin (Quelle: Nutzenbewertungsverfahren zu Trastuzumab Deruxtecan (2023))
GRADE	
⊕⊕⊕⊖	OS: Vorteil gegenüber Kontrollintervention
⊕⊕⊕⊖	PFS: Vorteil gegenüber Kontrollintervention
⊕⊕⊕⊖	Patientenberichtete Symptomatik: Vorteile (Gesundheitszustand, Schmerzen, Schlaflosigkeit, Diarrhö, Symptome im Brust- und Armbereich), Nachteile (Verstopfung, Übelkeit und Erbrechen), ansonsten keine Unterschiede
⊕⊕⊕⊖	QoL: Vorteile (globaler Gesundheitsstatus, körperliche, kognitive, soziale Funktion und Rollenfunktion), ansonsten keine Unterschiede
⊕⊕⊕⊖	Gesamt-SUE, Gesamt-UE CTCAE Grad ≥ 3 , Therapieabbruch aufgrund von UE: Vorteil (SUE), ansonsten kein Unterschied
⊕⊖⊖⊖-⊕⊕⊖⊖	Spezifische UE: Vor- und Nachteile

Quelle: Das Kurzprofil fasst die Ergebnisse der umfassenderen [Evidenzauflösungen zu medikamentösen Therapien beim metastasierten Mammakarzinom](#) zusammen.