

Evidenzkurzprofil zu Sacituzumab Govitecan beim triple negativen Mammakarzinom im fortgeschrittenen oder metastasierten Stadium

Population	Patientinnen mit tripel-negativem fortgeschrittenen oder metastasierten Mammakarzinom nach Vorbehandlung mit 2 oder mehr systemischen Therapien, darunter mindestens 1 gegen die fortgeschrittene Erkrankung
Intervention	Sacituzumab Govitecan
Evidenzgrundlage	Studie ASCENT (NCT02574455): Sacituzumab Govitecan vs. Therapie nach ärztlicher Maßgabe (Capecitabin, Eribulin oder Vinorelbin) (Quelle: Nutzenbewertungsverfahren zu Sacituzumab Govitecan (2022))
GRADE	
⊕⊕⊕⊕	OS: Vorteil gegenüber Kontrollintervention
⊕⊕⊕⊕	PFS: Vorteil gegenüber Kontrollintervention
⊕⊕⊕⊖	Patientenberichtete Symptomatik: Vorteil (Fatigue, Schmerzen, Dyspnoe) und Nachteil (Diarrhö), ansonsten keine Unterschiede
⊕⊕⊕⊖	QoL: Vorteile (körperliche Funktion, Rollenfunktion und emotionale Funktion), ansonsten keine Unterschiede
⊕⊕⊕⊖-⊕⊕⊕⊖	Gesamt-SUE, Gesamt-UE CTCAE Grad ≥ 3, Therapieabbruch aufgrund von UE: Vorteil (SUE), ansonsten keine Unterschiede
⊕⊕⊕⊖	Spezifische UE: Vor- und Nachteile
Quelle: Das Kurzprofil fasst die Ergebnisse der umfassenderen Evidenzaufarbeitungen zu medikamentösen Therapien beim metastasierten Mammakarzinom zusammen.	